

- 4
- Vis dette kortet til alle leger som behandler deg, ikke bare nevrologen.
 - Se pakningsvedlegget for TYSABRI for mer informasjon.
 - Behold dette kortet i 6 måneder etter siste dose med TYSABRI, fordi bivirkninger kan oppstå også etter du har avsluttet behandlingen med TYSABRI.
 - Vis dette kortet til din partner eller dine nærmeste. Det kan hende de ser symptomer på PML som du selv ikke legger merke til, f.eks endringer i humør eller adferd, hukommelsesvikt eller vanskeligheter med språk eller kommunikasjon.

Pasientens navn: _____

Legens navn: _____

Legens telefonnummer: _____

TYSABRI® er et registrert varemerke eid av Elan Pharma International Ltd. i flere land.

Biogen Idec™ er et varemerke eid av Biogen Idec.

© Juni 2010 Biogen Idec Norway AS



TYSABRI
(natalizumab)

TY00-NOR-261.06

Informasjonskort til pasienten

TYSABRI
(natalizumab)

TYSABRI® (natalizumab)

pasientkort

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før du får TYSABRI og under behandling med TYSABRI.

Før behandling med TYSABRI

- Du skal ikke behandles med TYSABRI dersom du har alvorlige problemer med immunforsvaret.
- Du skal ikke få langvarig behandling med andre medisiner for multippel sklerose mens du får TYSABRI.

1

Under behandling med TYSABRI

Det er rapportert at en sjelden hjerneinfeksjon som kalles PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) har forekommet hos pasienter som har fått TYSABRI. PML fører vanligvis til alvorlig uførhet eller død. Risiko for PML ser ut til å øke med behandlingens varighet, spesielt etter 2 år.

Symptomene på PML kan ligne et MS-anfall (f.eks svakhets tegn eller synsforstyrrelser). Det er derfor meget viktig at du kontakter legen din så snart som mulig hvis du tror at din MS blir verre eller hvis du legger merke til nye symptomer.

PML symptomer oppstår gjerne mer langsomt enn de som er assosiert med et MS-angrep og kan likne dine MS symptomer.

2

Tegn kan være:

- endring i mental tilstand og konsentrasjonsevne
- atferdsendringer
- ensidige svekkelser av kroppsfunksjoner
- synsproblemer
- nye neurologiske symptomer som er uvanlige for deg.

Håndtering av PML krever avbrytelse av behandling og fjerning av TYSABRI fra blod via plasmautbytting. Hos pasienter med PML oppstår en betennelsesreaksjon kjent som IRIS gjerne etter få uker etter fjerning av TYSABRI. IRIS kan lede til ulike symptomer, inkludert forverring av hjerne (neurologisk) funksjon.

Andre alvorlige infeksjoner kan oppstå med TYSABRI. Kontakt lege så snart som mulig dersom du tror du har en alvorlig og vedvarende infeksjon.

3